Travaux scientifiques de l'Armée d'Orient (1916-1919).
Coléoptères Silphidæ,

par M. G. Portevin.

---

1. EUCINETINI.

Genre : **Eucinetus** Germar.

1° *E. hæmorrhoïdalis* Germ. — Bords du Vardar : Environs de Karasouli et de Sarigol (Dr Rivet, 1916), un exemplaire.

2. SILPHINI.

Genre : **Ablattaria** Reitter.

1° *A. laevigata* L. var. *meridionalis* Ganglb. — Bas Vardar : Topsin (Dr Visbecq, avril 1918), 1 exemplaire.

Var. *gibba* Br. — Nombreux exemplaires. — Camp de Zeitenlik, près Salonique (lieutenant Pinchon, sept. 1917). — Yenidje-Vardar (Dr Joyeux, juillet-août 1917). — Excissou près du lac Ostrovo (mai 1918). — Itéa, golfe de Corinthe (capitaine Magdelaine, mars 1918). — Environs de Guénendjé (mars 1919).

Genre **Thanatophilus** Leach.

1° *T. sinnatus* L. — Albanie : Starova (caporal Vuillaume, 1918), 1 exemplaire. — Environs de Koritza (D. Blanc, 1917), 1 exemplaire.

2° *T. rugosus* L. — Macédoine : Florina (lieutenant Cohen, janv.-fév. 1918). — Serbie, près de Monastir, à 1200 mètres d'altitude (capitaine Magdelaine, avril 1918). — Albanie : Starova (caporal Vuillaume et soldat Brumont, juin-juillet 1918).

Genre **Aclypea** Reitter.

1° *A. undata* Muller. — Nombreux exemplaires. — Serbie : région d'Iven (Dr Vergne, 1917). — Macédoine : Kotor-le-Haut, près Florina, et

camp Grossetti (capitaine Magdelaine, avril 1918). — Macédoine (Dr Rivet, 1918).

Genre **Silpha** Linné.

1° *S. obscura* L. — Macédoine : Florina (lieutenant Cohen, juin 1918). — Albanie : Starova (caporal Vuillaume, avril-mai 1918). — Serbie : boucle de la Cerna, environs d'Iven, 800 à 1200 mètres (J. Houdard, 1917); environs de Holeven (Dr Barbier, mai 1918). — Brod et Bach, sur la Cerna (infirmiers Lanoue et Martinez, août 1917).

2° *S. orientalis* Br. — Mytilène (Dr Landrieu, avril 1917). — Macédoine : environs de Guénendjé et Kastoria (1919). — Excissou (mai 918). — Plaines du Vardar (G. Rollet, août 1919).

3° *S. Olivieri* Bed.— Nombreux exemplaires. — Environs de Salonique (Dr Rivet, 1917). — Sorbie : environs de Monastir, à 1200 mètres (capitaine Magdelaine, avril 1918). — Macédoine : environs de Florina (capitaine Magdelaine, mai 1918); environs de Guénendjé (sept. 1919). — Environs de Salonique : Mont du Prophète Elie (Dr Berton, avril 1918; Dr Vauthier, 1918).

3. NECROPHORINI.

Genre **Necrophorus** Fabricius.

1° *N. humator* Ol. — Un exemplaire, au Mont du Prophète Élie, sur un cadavre de Tortue terrestre (Dr Berton, août 1918).

2° *N. vespillo* L. — Un exemplaire, plaine du Vardar (G. Rollet, août 1919).

3° *N. vestigator* Hersch. ab. *interruptus* Br. — Environs de Salonique : Mont du Prophète Élie (Dr Berton, 1918). — Macédoine : Gorgop (mars 1918).

Il n'y a aucune raison pour changer le nom imposé par Brullé à cette forme. La description de cet auteur date de 1822 et a par conséquent la priorité sur celle de Stephens (1830). L'espèce de Stephens doit par suite porter régulièrement le nom de *fossor* Er.